

BURKINO 333394**Exterieur, Töchterfruchtbarkeit,
Färsenbulle**

geb.: 24.08.2010 - Züchter: Johannes Hempen, Wipplingen



Gesamtzuchtwert	Milchleistung	Exterieur	Zellzahl	Nutzungsdauer	Tö.-Fruchtbarkeit	Melkbarkeit
gRZG	gRZM	gRZE	gRZS	gRZN	gRZR	gRZD
139	117	124	117	130	123	106
65% Si.	72% Si.	55% Si.	76% Si.	51% Si.	41% Si.	68% Si.

Burkino entstammt der Our-Favorite-Conceited-Kuhfamilie. Diese Familie überzeugt durch ihr funktionelles Exterieur und ihre hohe Leistungsbereitschaft bei überdurchschnittlichen Eiweißgehalten. Nach RZG ist Burkino die Nr. 4 in Deutschland der Bogart-Söhne. Unter ihnen ist er die Nr. 1 in den Merkmalen Nutzungsdauer und Töchterfruchtbarkeit. Er vererbt sehr hohe Inhaltsstoffe bei mittlerer Milchmenge. Burkino kann als Färsenbulle eingesetzt werden.

Milchleistung (gZW)

Milch Kg	Fett %
+333	+0,19

Fett Kg	Eiweiß %
+32	+0,23

gRZM 117
72% Si.

Eiweiß Kg
+33

Exterieur (gZW)

Milchtyp
106

Körper
108

Fundament
117

gRZE 124
55% Si.

Euter
122

Größe	klein		112 groß
Milchcharakter	derb		105 edel
Körpertiefe	wenig		104 viel
Stärke	schwach		104 stark
Beckenneig.	ansteig.		93 abfall.
Beckenbr.	schmal		93 breit
Hi.Beinwink.	steil		95 gewink.
Klauen	flach		112 hoch
Sprunggel.	derb		107 trocken
Hi.Beinst.	hackeneng		102 parallel
Bewegung	schlecht		115 gut
Hintereuter	tief		112 hoch
Zentralband	schwach		115 stark
Strichplaz. vorne	außen		104 innen
Strichplaz. hinten	außen		105 innen
Vordereuter	lose		114 fest
Eutertiefe	tief		123 hoch
Strichlänge	kurz		106 lang



Burkino 333394
Bes.: WEU



Chilli 03 52171821
Mutter von Burkino

Funktionale Merkmale (gZW)

	Geburtsverlauf	
	maternal	paternal
	101	109